

ИНСТРУКЦИЯ по применению таблеток «Триметокс»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Таблетки «Триметокс» (Tabulettae «Trimetoxum»).
- 1.2 Препарат представляет собой таблетки плоскоцилиндрической формы от белого до кремово-серого цвета, допускается наличие вкраплений. На одной из поверхностей таблетки может быть нанесен фирменный логотип.
- 1.3 В одной таблетке содержится 0,4 г сульфадимидина, 0,08 г триметоприма и наполнителя – до 1,0 г.
- 1.4 Таблетки выпускают в полимерной таре по 50, 100, 200, 500, 1000 таблеток или в стрип-упаковке по 3, 6, 9, 12 и 15 таблеток.
- 1.5 Таблетки хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до плюс 25°С.
- 1.6 Срок годности препарата 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Таблетки «Триметокс» - комплексный препарат, содержащий сульфадимидин и триметоприм, которые проявляют синергическое действие против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающие инфекционные болезни.
- 2.2 Препарат нарушает синтез фолиевой кислоты и блокирует метаболизм тетрагидрофолиевой кислоты, необходимых для развития бактерий.
- 2.3 При пероральном введении препарат быстро всасывается в кровь и проникает во все органы и ткани животного. Максимальная бактерицидная концентрация отмечается в крови через 3-4 часа после применения и удерживается в течение 12 часов.
- 2.4 Препарат малотоксичен, выводится из организма преимущественно с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Таблетки «Триметокс» применяют в качестве лечебно-профилактического средства при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях, бактериальных осложнениях вирусных заболеваний у молодняка крупного рогатого и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек.
- 3.2 Таблетки «Триметокс» применяют внутрь групповым способом в смеси с кормом или индивидуально с водой два раза в сутки с равными интервалами в дозе: одна таблетка на 10 кг массы животного в течение 5-7 дней. Перед применением таблеток групповым способом с кормом их следует измельчить.
- 3.3 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные (димедрол, пипольфен) и препараты кальция, рекомендуют обильное питье.
- 3.4 Противопоказано совместное применение препарата с препаратами серы, новокаином и анестезином.
- 3.5 Не рекомендуется назначать препарат животным с нарушением функции почек, печени и органов кроветворения. Не применять препарат козам, беременным и кормящим самкам других видов животных.

3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать осторожность.

4.2 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы с препаратом руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

4.4 При случайном попадании препарата в организм человека необходимо принять обильное количество щелочной минеральной воды, вызвать рвоту, промыть желудок и обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1 ООО «Рубикон», г. Витебск, Республика Беларусь

Инструкция по применению таблеток «Триметокс» разработана заведующим кафедрой фармакологии и токсикологии Толкачем Н.Г., доцентом кафедры фармакологии и токсикологии Петровым В.В., профессором кафедры фармакологии и токсикологии Ятусевичем И.А., заведующим кафедрой внутренних незаразных болезней животных Белко А.А., доцентом кафедры внутренних незаразных болезней животных Ивановым В.Н., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

