

ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС (HIPRAVIAR ND BROILERS)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС против
ньюкаслской болезни инактивированной

(Организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.», Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС/HIPRAVIAR ND BROILERS.
Международное непатентованное наименование: Вакцина против ньюкаслской болезни инактивированная.
2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций. Вирусом ньюкаслской болезни (штамм Ла-Сота), инактивированного.
По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета. При хранении допускается расслоение эмульсии, однородность которой восстанавливается при взбалтывании.
Вакцина расфасована по 500 мл (2500 прививных доз) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. К каждому флакону прилагают инструкцию по применению вакцины на русском языке.
3. Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.
4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Замораживание вакцины не допускается.
5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, подвергавшиеся замораживанию, а также остатки вакцины, не использованные после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут.
Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю ньюкаслской болезни через 15 - 21 день после однократного применения, который сохраняется не менее 60 дней.
Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС предназначена для профилактики ньюкаслской болезни в птицеводческих хозяйствах мясного направления выращивания.
9. Запрещено вакцинировать клинически больную и/или ослабленную птицу.
10. Вакцинации подлежит клинически здоровая птица, начиная с суточного возраста. Контрольные сроки вакцинации птиц определяет ветеринарный специалист по результатам контроля напряженности специфического иммунитета.
Вакцину вводят однократно в объеме 0,2 мл подкожно в область средней трети шеи.
Перед применением вакцину выдерживают в течение 3 часов при комнатной температуре (18-25 °С). Перед применением и во время использования флакон с вакциной тщательно встряхивают для восстановления однородности эмульсии.
Вакцину вводят с соблюдением правил асептики и антисептики, для вакцинации используют обычные или полуавтоматические шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 минут. Допускается использование одноразовых шприцев. Не допускается применение для стерилизации инструментов химических дезинфицирующих средств. Место инъекции дезинфицируют 70%-ным спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

11. Симптомов проявления ньюкаслской болезни или других патологических признаков при введении двойной дозы вакцины не установлено.
12. Вакцина не вызывает клинически выраженной поствакцинальной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости, самопроизвольно исчезающей через 7 дней после вакцинации.
13. Следует избегать нарушений сроков проведения иммунизации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики ньюкаслской болезни.
14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.
15. Взаимодействие вакцины ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС с другими лекарственными препаратами не установлено.
16. Мясо, продукты убоя, полученные от привитой птицы, реализуют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.
18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть обеспечены спецодеждой (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи. Во время вакцинации запрещается прием воды и пищи, курение.
19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.
При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.
20. Организация-производитель «Laboratorios Hipra, S.A.»/«Лабораториос Хипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.
Инструкция по применению вакцины ХИПРАВИАР ND БРОЙЛЕРС против ньюкаслской болезни инактивированной разработана «Лабораториос Хипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ "ВГНКИ"



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com