

В 1 мл содержится: 50 мг цефтиофура гидрохлорид



- Антибактериальный препарат группы цефалоспоринов 3-го поколения
- Широкий спектр антибактериального действия
- Лечит заболевания без утилизации молока: гинекологические, респираторные, опорнодвигательного аппарата
- Выгодная цена!

Механизм действия

Бактерицидное действие цефтиофура основано на способности ингибировать бактериальные ферменты – транспептидазы и карбоксипептидазы, участвующие в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что в результате приводит к гибели бактерии.

Показания к применению

Цефтиофур, входящий в состав препарата, оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Salmonella* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Fusobacterium necrophorum* и *Porphiromas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*).

Цефтил применяют для лечения крупного рогатого скота и свиней при бактериальных инфекциях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, сепсисе, послеродовых инфекциях, маститах, артритах; крупного рогатого скота при некробактериозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

Порядок применения

Внутримышечно или подкожно один раз в сутки в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту в дозе 1.0 мл на 50 кг массы животного, но не более 15 мл в одно место;
- молодняку крупного рогатого скота в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного, но не более 5 мл в одно место;
- свиньям препарат применяют в дозе 1.0 мл на 16 кг массы животного, но не более 10 мл в одно место.

Перед каждым использованием содержимое флакона тщательно перемешивают. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

Сроки ожидания

Убой на мясо крупного рогатого скота проводят не ранее, чем через 8 суток, свиней – через 6 суток после последнего введения лекарственного препарата. Молоко – без ограничений.

Срок годности

24 месяца

Вид животного

Крупный рогатый скот, Свиньи