

# ИНСТРУКЦИЯ по применению «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» раствор для инъекций

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» раствор для инъекций.  
Международное непатентованное наименование: «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject».  
Применяют для профилактики гиповитаминозов у крупного рогатого скота, овец и свиней, а также заболеваний, развивающихся на фоне недостаточности витаминов в кормах, и в виде вспомогательного средства при лечении инфекционных и других заболеваний.
2. Лекарственная форма: инъекционный раствор.  
«Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» содержит в качестве действующих веществ:  
Витамин А мин. 50 000 МЕ/мл

- Витамин Е 3,6 - 4,4 мг/мл  
Витамин В<sub>12</sub> 10 мг/мл  
Витамин D<sub>3</sub> мин. 25 000 МЕ/мл  
Витамин В<sub>2</sub> 1 мг/мл  
Витамин В<sub>6</sub> 5 мг/мл  
Витамин В<sub>3</sub> 12,5 мг/мл  
Витамин В<sub>1</sub> 10 мг/мл  
Витамин С 1 мг/мл  
Вода для инъекций 1 мл
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный, вязкий, желтый раствор с характерным запахом, без механических примесей. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.  
После первого вскрытия упаковки препарат годен в течение 28 дней.  
Запрещается использовать препарат после окончания его срока
  4. Выпускают «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» раствор для инъекций расфасованным по 1, 5, 10, 50, 100, 250 и 500 мл во флаконах. Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению.
  5. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 25°C.
  6. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» следует хранить в недоступном для детей месте.
  7. Неиспользованный лекарственный препарат

годности.

8. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
9. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» препарат содержит витамины группы А, В, С, D и Е. Эти активные веще-

ства дополняют недостатки в организме животного, в то время как избыток разлагается биологически.

## II. Фармакологические свойства

9. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» препарат содержит витамины группы А, В, С, D и Е. Эти активные вещества дополняют недостатки в организме животного, в то время как избыток разлагается биологически.

## III. Порядок применения

10. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» раствор для инъекций применяется для лечения и профилактики витаминного дефицита во время болезни и выздоровления млекопитающих и птиц.  
Крупный рогатый скот 2 - 6 мл / 100 кг массы тела  
Овцы, свиньи, козы 1,5 -2,5 мл / 50 кг массы тела  
Поросята, ягнята 1 - 1,5 мл / 10 кг массы тела  
Собаки 0,5 -5 мл / 10 кг массы тела
11. Противопоказания к применению препарата не установлены.  
Цыплята 1 мл  
Индюшата 2 мл  
Утята и гусята 3 мл
12. Дозировка и способ применения:  
Индейки 5 мл  
Утки 4 л

Куры	2 мл
Голуби	1,5 мл
Гуси	6 мл

13. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

14. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

15. «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» совместим с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

16. Не рекомендуется применение «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» раствор для инъекций перед убоем.

17. Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 72 часа после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

19. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» В случае появления аллергических реакций или при случайном

попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

20. Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

21. Организация - производитель «Nanjing Vetop Pharma Co., LTD» 16 Tuanshan East Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, China

#### IV. Меры личной профилактики

18. При работе с «Мультипульсамин инъект / Multipulsamin inject» следует соблюдать общие правила

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.