

АВИСАН СЕКЬЮР (AVISAN SECURE)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины АВИСАН СЕКЬЮР против сальмонеллеза птиц инактивированной эмульгированной

(организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.», Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АВИСАН СЕКЬЮР/AVISAN SECURE

Международное непатентованное наименование: Вакцина против сальмонеллеза птиц инактивированная эмульгированная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета.

Вакцина расфасована по 500 мл (1000 доз), в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные полимерными пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон снабжают инструкцией по применению вакцины на русском языке.

3. Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Замораживание вакцины не допускается.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Вакцину во флаконах без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающую однородность при взбалтывании, а также остатки вакцины, не использованные в течение 10 ч после вскрытия флаконов, бракуют и обеззараживают кипячением, или 2% раствором щелочи, или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут. Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у кур к возбудителям сальмонеллеза через 3 - 4 недели после двукратного введения, который сохраняется в течение всего продуктивного периода яйцекладки и передается потомству трансвариально.

Одна иммунизирующая доза вакцины (0,5 мл) содержит не менее 10⁹ инактивированных клеток *Salmonella typhimurium* и не менее 10⁹ инактивированных клеток *Salmonella enteritidis*.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина АВИСАН СЕКЬЮР предназначена для профилактики сальмонеллеза кур в птицеводческих племенных и промышленных стадах различных направлений выращивания.

9. Запрещено вакцинировать клинически больную и/или ослабленную птицу.

10. Вакцинации подлежат птицы, в том числе полученная от иммунизированных родителей, в 8-10 недельном возрасте с последующей ревакцинацией в возрасте 14-17 недель, но не позже чем за 3 недели до начала яйцекладки.

Вакцину вводят внутримышечно в грудную или бедренную группу мышц, в объеме 0,5 мл.

Перед применением вакцину выдерживают в течение 3-4 часов при комнатной температуре (15-25 °С). Во время проведения иммунизации вакцину во флаконе периодически взбалтывают.

При проведении вакцинации соблюдают правила асептики и антисептики. Для вакцинации используют обычные или полуавтоматические шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 30 минут. Место инъекции обрабатывают раствором спирта 70%-или другим дезинфицирующим средством.

11. Симптомы проявления сальмонеллеза при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичной иммунизации и /или ревакцинации не установлено.

13. Следует избегать нарушения сроков проведения вакцинации в связи с тем, что это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики сальмонеллеза. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В единичных случаях на месте инъекции возможно образование незначительной припухлости, исчезающей в течение 2-3недель после вакцинации. Кроме того, иногда может отмечаться небольшое снижение общей активности вакцинированных птиц продолжительностью до 2 суток.

15. Запрещено применять вакцину АВИСАН СЕКЬЮР совместно с другими иммунобиологическими препаратами. Влияние других ветеринарных препаратов на безопасность и эффективность данной вакцины при совместном использовании не установлено.

16. Продукты убоя и яйца, полученные от вакцинированных птиц, реализуют без ограничений, не зависимо от сроков вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть обеспечены спецодеждой (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи. Во время вакцинации запрещается прием воды и пищи, курение.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель «Laboratorios Hipra, S.A.»/«Лабораториос Хипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain. Инструкция по применению вакцины АВИСАН СЕКЬЮР против сальмонеллеза птиц инактивированной эмульгированной разработана «Лабораториос Хипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com